

# DEFUNGAL

## *Hamuje wzrost grzybów chorobotwórczych*



**DEFUNGAL** to preparat przeciwgrzybiczy, wykazujący silne działanie bójcze wobec grzybów z rodzaju *Aspergillus flavus*, *Aspergillus fumigatus* i *Candida albicans*. Doskonała skuteczność preparatu wynika z jednoczesnego zastosowania jodu, mieszaniny naturalnych olejków eterycznych, ekstraktu z glistnika oraz witaminy A. Substancje aktywne **DEFUNGAL**-u łatwo przenikają do krwi i narządów wewnętrznych a wydalanie ich przez płuca, skórę, nerki i wątrobę gwarantuje działanie preparatu w obrębie całego organizmu. **DEFUNGAL** stosowany zapobiegawczo minimalizuje ryzyko rozwoju i wystąpienia grzybicy oraz ogranicza częstotliwość występowania chorób górnych dróg

**SKŁAD (w 1 L):** Jodek potasu, *Oleum pini*, *Malaleuca alternifolia*, *Chelidonium majus*, witamina A 15 mln j.m, nośnik ad 1000ml.

**WSKAZANIA:** **DEFUNGAL** przeznaczony jest do podawania u wszystkich gatunków i grup produkcyjnych drobiu:

- zapobiegawczo przez cały okres odchowu lub w sytuacjach zwiększonego zagrożenia (np. stosowanie ściółki gorszej jakości, podejrzenie zakażenia piskląt sporami grzybów w wylęgarni),
- osłonowo podczas i po antybiotykoterapii,
- leczniczo w przypadku wystąpienia grzybic układu oddechowego i pokarmowego.

### **DAWKOWANIE:**

		<b>Czas podawania</b>	<b>Dawkowanie</b>
<b>Dawkowanie w wodzie do picia</b>	<b>Zapobiegawczo</b>	3-5 dni	100-200ml/1000L wody, 8-12h dziennie
	<b>Leczniczo przy grzybicy układu oddechowego i pokarmowego</b>	5 dni	200-300 ml/1000 l wody, 8-12h godzin dziennie
<b>Dawkowanie w oprysku</b>	<b>Zapobiegawczo i osłonowo</b>	Przez pierwszy tydzień życia ptaków, 7 dni	100-200 ml/10 l ciepłej wody, 1 raz dziennie
		Przez resztę odchowu	100-200 ml/10 l ciepłej wody, 3 razy w tygodniu
		Podczas i po antybiotykoterapii	200 ml/10 l ciepłej wody, 2 razy dziennie
	<b>Leczniczo przy grzybicy układu oddechowego i pokarmowego</b>	5 dni	300 ml/10 l ciepłej wody, 2 razy dziennie

**W celu uzyskania maksymalnego efektu należy rozpylić preparat na wysokości około 2m nad głowami ptaków. Należy użyć taką ilość roztworu, aby pokryć równomiernie całą powierzchnię hali produkcyjnej.**

**KARENCA:** Nie obowiązuje.

**OPAKOWANIE:** 1 L.