



Ветеринарные препараты для птицеводства



Содержание

1.1. Вакцины против кокцидиоза.

Иммукокс С1 для цыплят живая.....	4
Иммукокс С2 для цыплят живая.....	5
Иммукокс Т для индеек.....	6
ГЕ ВАК Вакцина против геморрагического энтерита индеек живая.....	7

1.2. Фитопрепараты.

Биостимин.....	8
Кокцилин.....	9
Алисан.....	10
Сальмаколь.....	11
Биостоп.....	12
Кардиокс ликвид.....	13
Дефунгал.....	14
Дэтокс нёска.....	16
Гепавал.....	17
Гепамикс форте.....	18
Минтамикс.....	19
Мускулан ликвид.....	20
Нефриль.....	21
Нефриль ликвид.....	22
Нервак.....	23
Осмозан.....	24
Осмозан ликвид.....	25
Осмозан аниси.....	26
Пребиос ликвид.....	27
Виовит.....	28
Биостартер ликвид.....	29
Хербивит.....	30

1.3. Витаминно-минеральные препараты.

С+.....	32
Биотин+Цинк.....	33
Кальцимикс.....	34
С комплекс.....	35
АДЗЕК.....	36
D ₃ + Кальций.....	37
D ₃ +Минерал.....	38

Е-селен.....	39
Мангамакс.....	40
Макси В.....	41

1.4. Подкислители.

Индоцид.....	42
Мульти АКТИВ.....	43
Изо АКТИВ.....	44

ИММУКОКС С1 цыплят

ЖИВАЯ



ИММУКОКС® – С1 цыплят живая (IMMUCOX® - С1) - живая вакцина для профилактики эймериоза, индуцирующая формирование иммунитета против эймериоза через 2 недели после применения, который сохраняется в течение 3-4 мес.

СОСТАВ: ИММУКОКС® – С1 состоит из двух частей: разбавитель в пакетах IMMUCOX® diluent (часть 1 из 2) и ампулы с вакциной (часть 2 из 2). Ампулы (15 мл) содержат смесь наиболее важных с экономической точки зрения видов *Eimeria*: *Eimeria acervulina*, *E.maxima*, *E.necatrix* и *E.tenella*. Компоненты вакцины включают в себя воду, пищевые красители и калия дихромат. Разбавитель в порошке для введения с питьевой водой состоит из: каррагенана, кармеллозы и мальтодекстрина в воде для приготовления уникального суспензионного раствора ооцист.

ПОКАЗАНИЯ: Применяется для здоровых кур в возрасте 1-5 дней вместе с питьевой водой, а также в виде гелевых шайб и гель-спрея.

ДОЗИРОВКА: Один пакет с IMMUCOX® diluent необходимо растворить в 4 л чистой, охлажденной до комнатной температуры питьевой воды, свободной от ионов железа и хлора (из расчета один пакет на 1000 птиц). Тщательно перемешать. В полученный раствор добавить 1 флакон с вакциной Иммукок – С1 и также тщательно перемешать.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

Вакцину необходимо хранить при температуре от 3 до 7 °С. Разбавитель необходимо хранить в прохладном, сухом месте. К вакцинации допускается только здоровая птица. Не допускается проведение вакцинации за 21 день до забоя.

Запрещается:

- смешивать вакцину Иммукок с другими лекарственными средствами против эймериоза или химиотерапевтическими препаратами.
- использовать с кормом и водой кокцидиостатики и антибиотики, обладающие антикокцидийной активностью, включая тетрациклин, сульфа- и нитрофураны, перед вакцинацией, во время ее проведения и в течение 12 дней после окончания.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Риск передозировки отсутствует. Обычно при превышении рекомендованной дозы в 1000 раз смерть не наступает.

Ограничений в использовании мяса от птицы привитой вакциной Иммукок - С-1, нет.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Срок годности вакцины 7 месяцев, при t = - 3-7°С.



ИММУКОКС С2

ЦЫПЛЯТ ЖИВАЯ



ИММУКОКС® – С2 цыплят живая (IMMUCOX® - С2) - живая вакцина для профилактики эймериоза, индуцирующая формирование иммунитета против эймериоза у стад через 2 недели после применения, который сохраняется в течение 3-4 мес.

СОСТАВ: ИММУКОКС® – С2 состоит из двух частей: разбавитель в пакетах IMMUCOX® diluent (часть 1 из 2) и ампулы с вакциной (часть 2 из 2). Ампулы (15 мл) содержат смесь наиболее важных с экономической точки зрения видов *Eimeria*: *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix* и *E. tenella*. Компоненты вакцины включают в себя воду, пищевые красители и калия дихромат. Разбавитель в порошке для введения с питьевой водой состоит из: каррагенана, кармеллозы и мальтодекстрина в воде для приготовления уникального суспензионного раствора ооцист.

ПОКАЗАНИЯ: Применяется для здоровых кур в возрасте 1-5 дней вместе с питьевой водой, а также в виде гелевых шайб и гель-спрея.

ДОЗИРОВКА: Один пакет с IMMUCOX® diluent необходимо растворить в 4 л чистой, охлажденной до комнатной температуры питьевой воды, свободной от ионов железа и хлора (из расчета один пакет на 1000 птиц). Тщательно перемешать. В полученный раствор добавить 1 флакон с вакциной Иммукоккс – С1 и также тщательно перемешать.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

Вакцину необходимо хранить при температуре от 3 до 7 °С. Разбавитель необходимо хранить в прохладном, сухом месте. К вакцинации допускается только здоровая птица. Не допускается проведение вакцинации за 21 день до убоя.

Запрещается:

- смешивать вакцину Иммукоккс с другими лекарственными средствами против эймериоза или химиотерапевтическими препаратами.
- использовать с кормом и водой кокцидиостатики и антибиотики, обладающие антикокцидийной активностью, включая тетрациклин, сульфа- и нитрофураны, перед вакцинацией, во время ее проведения и в течение 12 дней после окончания.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Риск передозировки отсутствует. Обычно при превышении рекомендованной дозы в 1000 раз смерть не наступает.

Ограничений в использовании мяса от птицы привитой вакциной Иммукоккс - С-2, нет.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Срок годности вакцины 7 месяцев, при t = - 3-7°С.



ИММУКОКС Т

для индеек



ИММУКОКС® – Т для индеек (IMMUCOX® -Т) - живая вакцина для профилактики эймериоза, индуцирующая формирование иммунитета против эймериоза у индеек через 2 недели после применения, который сохраняется в течение 3-4 мес.

СОСТАВ: ИММУКОКС® – Т состоит из двух частей: разбавитель в пакетах IMMUCOX® diluent (часть 1 из 2) и ампулы с вакциной (часть 2 из 2). Ампулы (15 мл) содержат смесь наиболее важных с экономической точки зрения видов *Eimeria* для индеек: *Eimeria adenoides* и *E. meleagridis*. Компоненты вакцины включают в себя воду, пищевые красители и калия дихромат. Разбавитель в порошке для введения с питьевой водой состоит из: каррагенана, кармеллозы и мальтодекстрина в воде для приготовления уникального суспензионного раствора ооцист.

ПОКАЗАНИЯ: Применяется для здоровых индеек в возрасте 1-5 дней вместе с питьевой водой, а также в виде гелевых шайб и гель-спрея.

ДОЗИРОВКА: Один пакет с IMMUCOX® diluent необходимо растворить в 4 л чистой, охлажденной до комнатной температуры питьевой воды, свободной от ионов железа и хлора (из расчета один пакет на 1000 птиц). Тщательно перемешать. В полученный раствор добавить 1 флакон с вакциной Иммукок – Т и также тщательно перемешать.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

Вакцину необходимо хранить при температуре от 3 до 7 °С. Разбавитель необходимо хранить в прохладном, сухом месте. К вакцинации допускается только здоровая птица. Не допускается проведение вакцинации за 21 день до убоя.

Запрещается:

- смешивать вакцину Иммукок с другими лекарственными средствами против эймериоза или химиотерапевтическими препаратами.
- использовать с кормом и водой кокцидиостатики и антибиотики, обладающие антикокцидийной активностью, включая тетрациклин, сульфа- и нитрофураны, перед вакцинацией, во время ее проведения и в течение 12 дней после окончания.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Риск передозировки отсутствует. Обычно при превышении рекомендованной дозы в 1000 раз смерть не наступает.

Ограничений в использовании мяса от птицы привитой вакциной Иммукок - Т, нет.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Срок годности вакцины 7 месяцев, при t = - 3-7°С.



Вакцина ГЕ ВАК

против геморрагического энтерита индеек живая



СОСТАВ: Вакцина ГЕ ВАК против геморрагического энтерита индеек живая (HE VAC) содержит в своем составе живой авирулентный аттенуированный в культуре лимфобластов аденовирус фазанов II типа. Вакцина представляет собой замороженную жидкость. Вакцину расфасовывают по 5 мл, содержащих - 1,000 доз; 10 мл, содержащих - 2,000 доз; 25 мл, содержащих - 5,000 доз. в пластиковые флаконы (HDPE)

ПОКАЗАНИЯ: Вакцинируют индюшат однократно в возрасте 25-28 суток. Вакцина вызывает стимуляцию иммунного ответа против геморрагического энтерита у однократно привитых птиц через 14 суток и сохраняется в течение 12 месяцев.

ДОЗИРОВКА: Перед вакцинацией флакон с вакциной размораживают естественным способом (при комнатной температуре). Содержимое флакона (1000 доз) разводят в 760 мл воды и тщательно смешивают с 76 л воды. Разрешается добавлять в воду сухое обезжиренное молоко из расчета 100г на 76 л воды. Вакцину выпаивают в течение 12 часов. Не разрешается выпаивать вакцину с хлорированной водой и другими лекарственными средствами. 24 часа до и после применения вакцины запрещается применение противомикробных препаратов и дезинфектантов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: Иммунизации подлежит клинически здоровая птица. Противопоказаний для применения вакцины и побочного действия не обнаружено. Взаимодействие с другими вакцинами не изучено.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Риск передозировки отсутствует.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Срок годности вакцины 24 месяца с даты изготовления при условии хранения и транспортирования в сухом темном месте при температуре минус 4 С. В случае размораживания и хранения вакцины при температуре 2-8 оС срок годности- 1 месяц.



БИОСТИМИН

Стимулирует сопротивляемость организма



БИОСТИМИН – это сбалансированная композиция иммуностимулирующих субстанций, а также антибактериальных, противовирусных и противовоспалительных веществ. Свойства активных субстанций препарата (полифенолокислоты, флавоноиды, полиацетилены и алкиламиды), а также синергия их воздействия, позволяют эффективно применять БИОСТИМИН в ситуациях, требующих повышения сопротивляемости организма к различным заболеваниям или при восстановлении после перенесенных заболеваний. БИОСТИМИН, благодаря стимуляции иммунологической системы, а также благодаря противовоспалительным свойствам, рекомендуется к применению в период профилактических вакцинаций, а также при возникновении большинства проблем со здоровьем. Может применяться вместе с антибиотиком или витаминно-минеральными препаратами.

СОСТАВ (в 1Л):

Вытяжка с эхинацеи пурпурной – 35%
Вытяжка с гвоздичника ароматного (CoE188) – 35%
Вытяжка зверобоя обыкновенного (CoE234) – 25%
Вытяжка с жень-шеня (CoE318) – 5%
Эмульгаторы: Tween 80
Витамины:
Витамин B9 (фолиевая кислота) – 100 мг
Витамин E (DL-ацетат- α -токоферола) – 5 000мг
Se (E8) (селенит натрия) – 100 мг

ПОКАЗАНИЯ:

- вирусные инфекции, протекающие с иммуносупрессией
- период профилактических вакцинаций
- торможение приростов, вызванное бактериальными и вирусными заражениями
- период восстановления после перенесенных заболеваний

ДОЗИРОВКА:

200-400мл/1000Л питьевой воды, 12 часов в день в течение 5-7 дней

КАРЕНЦИЯ: не требуется

УПАКОВКА: 2Л

КОКЦИЛИН

Эффективная помощь При заражениях простейшими



КОКЦИЛИН позволяет ограничить выступление заражений анаэробными бактериями (*Clostridium perfringens*), а также инвазии простейших (*Eimeria*-sp., *Histomonas meleagridis*). Свойства, тормозящие рост бактерий и простейших без необходимости соблюдения каренции делают возможным безопасное и эффективное применение препарата у животных любого возраста. Кроме непосредственного эффекта по отношению к патогенам, КОКЦИЛИН оказывает особенно важное противовоспалительное и иммуностимулирующее действие, отвечающее за

скорейшую реконвалесценцию, а также меньшие потери, спровоцированные заболеванием. КОКЦИЛИН, применяемый профилактически или интервенционно, можно сочетать с химической терапией или витаминно-минеральными препаратами.

СОСТАВ:

- вытяжка чеснока обыкновенного (CoE26) – 45%
- вытяжка полыни (CoE61) – 28%
- вытяжка девясила большого (CoE240) – 23%
- вытяжка коричника цейлонского (CoE133) – 2%
- вытяжка душицы обыкновенной (CoE317) – 2%

Влажность – 12%

ПОКАЗАНИЯ: КОКЦИЛИН предназначен для подачи всем видам и производственным типам птиц:

- профилактически и разово в случае выступления заражений простейшими (кокцидиоз, гистомонадоз «черная голова»)

Кокцилин особенно рекомендуется к профилактическому применению в период повышенного риска выступления некротического энтерита или кокцидиоза.

ДОЗИРОВКА:

500мл/1000Л воды в течение 12 часов, на протяжении 5-7 дней.

КАРЕНЦИЯ: не требуется

ОБЪЕМ: 2Л

Алисан

Концентрированная вытяжка с чеснока



Алисан — это концентрированная вытяжка с чеснока с добавлением активных веществ эхинацеи пурпурной и жень-шеня. Содержит экстракт из трех растений, образующих смесь. Может применяться как вспомогательное средство при лечении антибиотиками.

СОСТАВ (в 1л):

Зоотехнические добавки:

экстракт с чеснока обыкновенного (СоЕ26) — 90%

экстракт с жень-шеня (СоЕ318) — 5%

экстракт эхинацеи пурпурной — 5%

ПОКАЗАНИЯ:

Препарат предназначен для подачи всем видам и производственным типам домашней птицы свиней.

- заражения пищевого тракта (вирусные, бактериальные, простейшими — Эймерия сп)
- противодействие сальмонеллезу, микоплазмозу, колибактериозу, а также некротическому воспалению кишечника
- ослабление сопротивляемости организма
- в период профилактических вакцинаций.

ДОЗИРОВКА:

250-400 мл/1000л питьевой воды, 12 часов в день, в течение 3-7 дней.

Пред применением корма или продлением периода применения следует проконсультироваться со специалистом по питанию или ветеринарным врачом.

КАРЕНЦИЯ: Не требуется

ОБЪЕМ: 2Л

САЛЬМАКОЛЬ

Эффективен в борьбе с болезнетворными микроорганизмами



Действие САЛЬМАКОЛЯ является результатом соответствующей композиции активных фитонцидов. Отсутствие периода каренции позволяет без ограничений применять препарат в каждый период жизни животных.

СОСТАВ (в 1Л):

- вытяжка с чистотела (СоЕ122) – 35%
- вытяжка с душицы обыкновенной (СоЕ317) – 20%
- эугенол (СоЕ188) – 7%
- масло чайного дерева (СоЕ275) – 5%
- тимол – 1%
- пропиленгликоль (13.11.1)
- I (E2)(йодистый калий) 10 000 мг

Влажность – 28%

ПОКАЗАНИЯ: Предназначен для подачи всем видам и производственным типам птиц и свиней:

- во время бактериальных заражений
- при воспалениях пищевого тракта
- при воспалениях верхних и нижних дыхательных путей
- в период вирусных инфекций

ДОЗИРОВКА:

В питьевой воде: 200-250 мл/1000л теплой воды в течение 3-7 дней, 2 раза в день
При опрыскивании: (Помещение поверхностью 1000м²) 200мл/5л-10л теплой воды в течение 3-7 дней, 2 раза в день.

КАРЕНЦИЯ: не требуется

Объем 2Л

БИОСТОП

устраняет диарею, удаляет токсины



БИОСТОП – это быстродействующий терапевтический антидиарейный препарат. Содержащиеся в препарате концентрированные растительные экстракты, обладающие вяжущим действием и изолированные бактерицидные вещества позволяют устранить диарею уже через несколько часов с момента применения.

ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Ингибирует размножение микроорганизмов, вызывающих диарею. Благодаря вяжущим свойствам, образует на поверхности эпителия кишечника слой денатурированного белка, препятствующего экссудации воды и электролитов в просвет кишечника.

Ограничивает всасывание свободных небелковых токсинов в пищеварительном тракте, а белковые токсины, главным образом, бактериальные, связывает в нерастворимые конгломераты, удаляемые через кишечник. Стабилизирует усиленную перистальтику кишечника, сопутствующую диарее. Ограничивает местную воспалительную реакцию, нормализуя состояние и функции слизистой оболочки кишечника.

СОСТАВ: Смесь растительных экстрактов, обладающих сильным вяжущим действием; бактерицидные вещества; носитель; стабилизатор.

Содержание активных веществ 75%.

ПОКАЗАНИЯ: **БИОСТОП** предназначен для использования любым видам домашней птицы в случае:

- появления поноса любой этиологии;
- постоянных проблем с мокрой подстилкой;
- диспепсии;
- неэффективности антибиотиков при лечении диареи;
- отсутствия возможности применения или наличие противопоказаний к применению антибиотиков.

ДОЗИРОВКА: 500 мл/1000 л (разводить не менее, чем в половине потребляемой воды в течение 3-5 дней или согласно указаниям ветврача).

КАРЕНЦИЯ: Не требуется

УПАКОВКА: 5 л.

Кардиокс Ликвид

Предотвращает инфаркты



КАРДИОКС Ликвид — это препарат, укрепляющий сердечнососудистую систему животных. Де активные формы меди, активные субстанции растительных экстрактов, а также лизин, обеспечивают комплексное действие препарата:

- активирует кроветворные процессы
- предотвращает инфаркты
- укрепляет кровеносные сосуды

СОСТАВ (в 1 л):

Медь (E4)($\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$; $\text{CuSo}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)

сорбитол (E420)

экстракт с боярышника однопетичного (CoE156)-2%, Л лизин (3.2.1) 120 000мг

Влажность 80%

ПОКАЗАНИЯ: КАРДИОКС Ликвид предназначен для подачи всем видам и производственным типам птицы. Особенно рекомендован в стадах на убой при проявлениях перегрузки сердечнососудистой системы.

ДОЗИРОВКА: 400-500 мл/1000л питьевой воды, в течение 3-5 дней.

ВНИМАНИЕ! Не следует применять препарата Кардиокс ликвид в течение 24 часов перед и после вакцинации (препарат содержит активные формы меди).

КАРЕНЦИЯ: НЕ ТРЕБУЕТСЯ

УПАКОВКА: 2Л

ДЕФУНГАЛ

приостанавливает рост патогенных грибков



ДЕФУНГАЛ - это препарат против грибков, проявляющий сильное фунгицидное действие против грибков *Aspergillus flavus*, *Aspergillus fumigatus* и *Candida albicans*. Отличная эффективность препарата следует из одновременного применения йода, смеси натуральных эфирных масел, экстракта чистотела большого и витамина А. Активные вещества препарата **ДЕФУНГАЛ** легко проникают в кровь и внутренние органы, а их выделение через легкие, кожу, почки и печень гарантирует действие препарата во всем организме. Профилактическое применение препарата **ДЕФУНГАЛ** сводит к минимуму риск развития и появления микоза и заболеваний верхних дыхательных путей.

СОСТАВ (в 1 л): Йодид калия 50 г; *Oleum pini* 100 г;
Malaleuca alternifolia 50 г; *Chelidonium majus* 400г;
Витамин А 15 млн м.е.; носитель до 1000 мл.

ПОКАЗАНИЯ: **ДЕФУНГАЛ** предназначен для всех видов домашней птицы:

- с профилактической целью в течение всего периода выращивания или в ситуации повышенного риска (напр. применение подстилки худшего качества, подозрение о заражении птенцов спорами грибов в инкубатории),
- с восстановительной и вспомогательной целью для желудочно-кишечного тракта во время и после лечения антибиотиками, а также в лечебных целях в случае появления микоза органов дыхания и системы органов пищеварения.

ДОЗИРОВКА - с питьевой водой:

Профилактика: 100-200 мл/1000 л воды, выпаивать 8-12 часов/день, в течение 3-5 дней или согласно предписаниям ветеринарного врача.

Лечение: 200-300 мл/1000 л воды, выпаивать 8-12 часов/день, в течение 5 дней или согласно предписаниям ветеринарного врача.

ДОЗИРОВКА - в виде опрыскивания: Профилактика и защита:

Первая неделя жизни птенцов: 100-200 мл/10 л теплой воды, 1 раз в день, в течение 7 дней;

Остальной период выращивания: 100-200 мл/10 л теплой воды, 3 раза в неделю;

Во время и после лечения антибиотиками: 200 мл/10 л теплой воды, 2 раза/день.


Лечение: 300 мл/10 л теплой воды, 2 раза/день, в течение 5 дней или согласно предписаниям ветеринарного врача.

КАРЕНЦИЯ: Не требуется

УПАКОВКА: 1 л.

ДЭТОКС нёска

повышает яйценоскость



ДЭТОКС нёска - это уникальная композиция активных компонентов трав и веществ, обладающих гепатопротекторными свойствами. Препарат оказывает сильное защитное и стимулирующее действие на клетки печени, восстанавливает и удерживает их высокую метаболическую активность, которая необходима для поддержания производительности кур-несушек.

ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- удлинение периода яйценоскости,
- более хорошая минерализация скорлупы, особенно в конечном периоде яйценоскости,
- более скорое восстановление яйценоскости после её сокращения,
- заметное улучшение биологической ценности яиц.

СОСТАВ: бетаины, холин, натуральные биологически активные вещества трав.

ДОЗИРОВКА:

Упаковка 1л (концентрат):

200 мл / 1000 л, питьевой воды 12 ч в день, в течение 3-5 дней

Упаковка 5л :

1000мл/1000Л питьевой воды 12 ч в день, в течение 3-5 дней

КАРЕНЦИЯ: Не требуется

УПАКОВКА: 1 л, 5 л.



ГЕПАВАЛ

Оптимальная деятельность печени



ГЕПАВАЛ – концентрированная витаминная и энергетическая смесь, помогающая в обмене углеводов, жиров и белков.

СОСТАВ:

Сорбитол, сульфат магния, холин, бетаин, Д-пантенол, Гидрохлорид ацетил-L-карнитина

ПОКАЗАНИЯ: ГЕПАВАЛ предназначен для применения у всех видов птиц и свиней:

- реконвалесценция после перенесенных заболеваний печени
- нарушения обмена жиров
- повышенное содержание жиров в корме

ПРИМЕНЕНИЕ:

Птица: 500мл/1000Л питьевой воды в течение 5-7 дней

Свиньи: 500мл/1000Л питьевой воды в течение 5-7 дней

ОБЪЕМ: 5Л

ГЕПАМИКС фортэ

Полное восстановление печени



ГЕПАМИКС фортэ это новая обогащенная рецептура на базе многолетних экспериментов в питании домашних птиц. Новое качество сырья и большее содержание активных веществ дают возможность полнейшего предохранения печени от разрушающего организм действия кормовых и бактериальных токсинов. Применяемый профилактически, ХЕПАМИКС фортэ гарантирует лучший метаболизм, благодаря чему имеет значимое влияние на конечный результат продукции.

СОСТАВ (в 1л):

- вытяжка артишока обыкновенного (СоЕ 565) — 8%
- вытяжка одуванчика лекарственного (СоЕ 447) — 8%
- вытяжка чистотела большого
- вытяжка куркумы длинной (СоЕ 163) — 2%
- Холин 10 000мг (хлорид холина)
- Бетаин 4 000мг

Влажность — 60%

ПОКАЗАНИЯ: ГЕПАМИКС фортэ рекомендуется подавать всем видам и продуктивным группам домашних птиц в случае:

- появления расстройства деятельности печени,
- пищевых отравлений,
- отравлений бактериальными токсинами
- расстройства жирового обмена в организме
- применения высоких доз жира в корме.

ДОЗИРОВКА: 250-500 мл /1000 л питьевой воды, 12 часов в день, в течение 3 – 5 дней.

КАРЕНЦИЯ: Не требуется

ОБЪЕМ: 5Л

МИНТАМИКС

*стимулирует устойчивость дыхательной системы;
облегчает и стимулирует дыхание*



МИНТАМИКС - это препарат, защищающий верхние дыхательные пути. Он улучшает кровоснабжение эпителия и ускоряет его восстановление. Оказывает дезинфицирующее действие на слизистую оболочку носа, носовых пазух и трахеи, а также повышает их устойчивость к влиянию неблагоприятных факторов окружающей среды и инфекциям.

СОСТАВ: Эфирные масла: мяты 11%, эвкалипта 18%; ментол 5,5%, цинеол, пинен, камфен, терпинеол, витамин А 30 млн. е.м., ретинол 10,32 мг.

ПОКАЗАНИЯ: Минтамикс предназначается для всех видов домашней птицы и свиней:

- с профилактической целью в период появления неблагоприятных условий среды (высокая температура, чрезмерное запыление, высокая концентрация вредных газов),
- во время заболеваний верхних дыхательных путей (воспалительное состояние носа, пазухи, трахеи), а также в период выздоровления с целью возобновления эпителия слизистых оболочек,
- для дезинфекции слизистых оболочек носа, пазух и трахеи (ингаляция).

ДОЗИРОВКА: С питьевой водой: 150-200 мл/1000 л питьевой воды, 8-12 часов в день в течение 5 дней.

Ингаляция: 150-200 мл/10 л теплой воды 2 раза в день в течение 5 дней или по указаниям ветврача. **КАРЕНЦИЯ:** Не требуется

УПАКОВКА: 1 л.

МУСКУЛАН ЛИКВИД

Стимулирует прирост мышечной ткани



МУСКУЛАН ликвид содержит смесь оптимально сбалансированных растительных экстрактов, которые положительно влияют на пищеварение и усвоение белка, содержащегося в корме. Большая доступность белка и питательных субстанций непосредственно влияют на повышение дневных приростов массы тела, а также улучшают усвоение корма быстро растущими животными на убой.

ПОКАЗАНИЯ: МУСКУЛАН ликвид предназначен

для подачи всем видам и производственным типам птицы.

СОСТАВ(В 1л):

- пропилен гликоль (13.11.1)
- экстракт с чистотела лекарственного (CoE122)-36%
- экстракт артишока обыкновенного (CoE565)-24%
- экстракт душицы обыкновенной (CoE317)-22%
- экстракт корыцы (CoE133)-2%

Влажность — 50%

ВНИМАНИЕ: добавление заквашивающих препаратов усиливает эффект воздействия **МУСКУЛАН ликвид**

Перед употреблением встряхнуть

КАРЕНЦИЯ: не требуется

УПАКОВКА: 2Л, 5Л

НЕФРИЛЬ

действует мочегонно и очищающе



НЕФРИЛЬ действует мочегонно и очищающе, ускоряет пассаж содержания кишечника и удаление из него токсинов, повышает секрецию ферментов, очищает печень от токсинов, а также облегчает переваривание жиров.

СОСТАВ: Хлористый аммоний 425 г; Сульфат магния 260 г; Сульфат натрия 240 г; сорбитол 75 г.

ПОКАЗАНИЯ: **НЕФРИЛЬ** предназначен для любого вида и производственной группы домашней птицы:

- острое и хроническое воспаление почек,
- пищевые отравления,
- отравления лекарствами,
- диспепсия,
- недостаточность выделения желчи и панкреатического сока,
- атония кишечника.

ДОЗИРОВКА: 1 кг препарата на 1000 л питьевой воды в течение 8-12 ч в день, 3-5 дней или по указаниям ветврача.

КАРЕНЦИЯ: Не требуется.

УПАКОВКА: 4 кг.

НЕФРИЛЬ ЛИКВИД

Действует мочегонно, активирует работу почек



Нефриль ликвид возобновляет нормальное функционирование почек. Ускоряет прохождение пищи по кишечнику, активирует секрецию энзимов, а также облегчает переваривание жиров.

СОСТАВ (в 1л): Диетические добавки:

- Витамины: витамин А (Е672) 6000 000 ед.
- Зоотехнические добавки:
- Экстракт пырейника — 10%
- Экстракт травы золотарника — 12%
- Вытяжка с петрушки обыкновенной (СоЕ326) — 10%
- Вытяжка с акалифы щетинистоволосистой — 48%
- Метионин — 20 г
- Лизин — 22 г

ПОКАЗАНИЯ: **НЕФРИЛЬ ликвид** предназначен для подачи всем видам и производственным типам птиц в случае:

- воспаления почек
- атонии кишечника
- несварения
- пищевых отравлений

ДОЗИРОВКА: 500мл/1000л питьевой воды, в течение 5-7 дней

Перед применением корма или продлением периода применения следует проконсультироваться со специалистом по питанию или ветеринарным врачом.

КАРЕНЦИЯ: не требуется

УПАКОВКА: 6л

НЕРВАК

седативный препарат для домашней птицы



НЕРВАК - это композиция натуральных растительных экстрактов *Valeriana officinalis* и *Melissa officinalis*. Основные компоненты препарата - валериановая кислота и мелиссовое масло - оказывают успокаивающее и релаксирующее действие на центральную нервную систему.

НЕРВАК позволяет снизить последствия стресса и снижает возбудимость животных.

СОСТАВ: Смесь натуральных экстрактов *Valeriana officinalis* и *Melissa officinalis*.

ПОКАЗАНИЯ: **НЕРВАК** предназначен для использования любым видам и производственным группам домашней птицы в периоды стресса.

ДОЗИРОВКА: 250 мл/1000 л питьевой воды в течение 3-5 дней или согласно указаниям ветврача.

КАРЕНЦИЯ: Не требуется.

УПАКОВКА: 1 л.

ОСМОЗАН

*смягчает последствия термического стресса,
предотвращает обезвоживание*



ОСМОЗАН - это изотонический энергетический препарат, регулирующий водно-электролитный баланс организма. Позволяет поддерживать соответствующий уровень воды, минеральных солей, энергетических и строительных компонентов. Предотвращает обезвоживание организма и улучшает аппетит.

СОСТАВ (г/кг): Сульфат натрия + карбонат натрия - 350 г; хлорид калия - 150 г; дигидросульфат магния - 110 г; кристаллическая глюкоза - 140 г; хлорид натрия - 50 г; глицин - 50 г; лимонная кислота - 120 г; стабилизатор - 30 г.

ПОКАЗАНИЯ: ОСМОЗАН предназначен для использования любым видам домашней птицы:

- в период высоких температур (применение в течение 5-10 дней);
- во время поносов и полиурии, а также после их прекращения (применение в течение 3-5 дней);
- в течение 3 дней перед отправкой на убой.
-

ДОЗИРОВКА: 0,5-1 кг/1000 л питьевой воды, выпаивание в течение 6-12 ч в сутки или согласно указаниям ветврача.

КАРЕНЦИЯ: Не требуется.

УПАКОВКА: 4 кг.

ОСМОЗАН Ликвид

Поддерживает кондицию и постоянный темп прироста



ОСМОЗАН Ликвид это соединение электролитов: натрия, калия, магния, а также бетаина и витамина С, которые возвращают организму равновесие, нарушенное в результате действия неблагоприятных факторов окружающей среды. Содержащийся в перпарате бетаин помогает поддерживать осмотический баланс, витамин С оказывает укрепляющее действие на кровеносные сосуды, уменьшает чувствительность к стрессу, а также повышает иммунитет. **ОСМОЗАН Ликвид** компенсирует нехватки, возникшие по причине стресса (высокая температура, транспорт, поносы).

СОСТАВ (в 1л):

- хлорид натрия (11.4.1) 8 000мг
- хлорид калия (11.5.1) 50 000мг
- сульфат магния (11.2.3) 18 000 мг
- витамин С (Е300) л-аскорбиновая кислота 30 000 мг
- бетаин 50 000мг
- эвкалиптовое масло (СоЕ 185) 50 000мг
- зола сырая 7.1%

ПОКАЗАНИЯ: **ОСМОЗАН Ликвид** предназначен для подачи всем видам и производственным типам птицы, а также свиньям:

- при нарушениях потребления воды и пищи, вызванных тепловым стрессом
- первые часы после вставления птиц на объект
- обезвоживание и спад кондиции
- последние дни жизни птиц с целью ограничения утрат массы тела в процессе перевозки на убойню.

ДОЗИРОВКА: 500мл/ 1000 л питьевой воды 12 часов в день, в течение 5 дней.

Эффекты после подачи:

1.Поддержание гомеостаза организма в период:

-теплового стресса

-транспортировки

-первых дней жизни птиц

-поносов

2.Улучшение кондиции и аппетита

3.Ограничения потерь массы тела во время транспортировки.

Перед применением корма или продлением периода применения следует проконсультироваться со специалистом по кормлению или ветеринарным врачом.

КАРЕНЦИЯ: не требуется

УПАКОВКА: 5л

ОСМОЗАН аниси

Восстанавливает гомеостаз организма после обезвоживания



ОСМОЗАН аниси - это изотонический препарат, обогащенный подкисляющими веществами и эфирным маслом *Fructus anisi*. При использовании односуточным цыплятам он восполняет потери воды после транспортировки, ускоряет резорбцию желточного мешка и деликатно стимулирует физиологические функции системы пищеварения. У птиц старшего возраста применяется после диареи, для нормализации водного баланса организма и восстановления перистальтики кишечника. Рекомендуется также перед транспортировкой птиц из одного производственного отделения в другое.

СОСТАВ (в 1 кг): Электролиты (сульфат натрия, карбонат натрия, хлористый калий, дигидросульфат магния, хлористый натрий) - 72%; подкисляющие вещества (лимонная кислота, яблочная кислота, винная кислота) - 20%; Anisi oleum - 5%; стабилизатор - 3%.

ПОКАЗАНИЯ: **ОСМОЗАН аниси** предназначен для любого вида и производственной группы домашней птицы:

- цыплятам в течение первых 3 дней жизни;
- в течение 3 дней перед планируемой транспортировкой птиц из одного производственного отделения в другое;
- в течение 3-5 дней после перенесённой диареи.

ДОЗИРОВКА: 250-500 г/1000 л питьевой воды, 8-12 часов в сутки, или согласно указаниям ветврача.

КАРЕНЦИЯ: Не требуется

УПАКОВКА: 2,5 кг.

ПРЕБИОС ЛИКВИД

Здоровье кишечника



ПРЕБИОС ликвид – это препарат, который содержит моно- и диглицериды жирных кислот, а также макро и микроэлементы. Жирные кислоты поддерживают гомеостаз, а также формируют правильную структуру пищевого тракта, влияют на улучшение пищеварения и усвоение питательных веществ корма

СОСТАВ (г/кг): моно- и диглицериды жирных кислот, глицерин, хлористый калий, натрия хлорид, цинк.

ПОКАЗАНИЯ: ПРЕБИОС 600 это препарат, предназначенный для всех видов птиц:

- в период интенсивного роста и развития
- несварения
- вспомогательно во время подачи растительных препаратов, а также пробиотиков

ПРИМЕНЕНИЕ: С питьевой водой: 1 Л/1000 Л, 8-12 часов/день, в течение 5-7 дней.

УПАКОВКА: 6Л.

ВИОВИТ

стимулирует темпы роста животных



ВИОВИТ - это композиция эфирных масел и натуральных растительных экстрактов, главным образом, на основе экстракта душицы обыкновенной (*Origanum vulgare*). Он улучшает аппетит, стимулирует процессы пищеварения. Обладает противовоспалительными и бактерицидными свойствами. После применения антибиотиков помогает восстановить функции пищеварительного тракта.

СОСТАВ: Травяные экстракты и эфирные масла содержащие: тимол до 40%, ацетат геранила до 5%, карвакол и сесквитерпены до 12%, свободные ароматные спирты до 15%, дубильные вещества до 8%, каротин, горечи, смолы, фитостеролы, минеральные соли, флавоноиды, витамин С.

ПОКАЗАНИЯ: **ВИОВИТ** предназначается всем видам домашней птицы и свиней:

- во время нарушения пищеварения и усвоения корма,
- при воспалении кишечника, поносах и пищевых отравлениях,
- вспомогательное действие при лечении воспаления пищеварительного тракта,
- после лечения антибиотиками для восстановления функционального равновесия пищеварительного тракта.

Заквашивающие препараты усиливают воздействие ВИОВИТА.

ДОЗИРОВКА: 100-200 мл препарата на 1000 л питьевой воды, 12-16 часов в день в течение 5-10 дней или по указаниям ветврача.

КАРЕНЦИЯ: Не требуется.

УПАКОВКА: 1 л, 5 л.

БИОСТАРТЕР ЛИКВИД

Натуральный допинг птенцов



БИОСТАРТЕР ликвид это препарат. Содержащий моно- и диглицериды жирных кислот, электролиты, витамин Д3, витамин С, а также анисовое масло, формирующее правильное развитие пищевого тракта и развитие молодых птиц. Соответствующий уровень электролитов обеспечивает гомеостаз организма и необходим в период начального выращивания

СОСТАВ: хлористый калий, сорбитол, хлорид магния, моно- и диглицериды жирных кислот, масло аниса, витамин С, бетаин..

ПОКАЗАНИЯ: Препарат рекомендуется давать всем видам и производственным типам домашней птицы:

- в первые дни жизни птицы,
- в несварение у молодых птиц
- низкие приросты у молодых птиц.

ПРИМЕНЕНИЕ:

500мл/1000Л питьевой воды

УПАКОВКА: 2Л

ХЕРБИВИТ

*полная гамма витаминов и аминокислот имеющая
ускоренное действие*



ХЕРБИВИТ - это препарат дополняющий диету птиц всеми нужными витаминами и аминокислотами, обогащенный специальной подготовленной смесью травяных экстрактов. Уникальное соединение витаминов, аминокислот, активно действующих веществ трав, позволяет препарату **ХЕРБИВИТ** действовать быстрее и эффективнее, чем обыкновенные поливитаминные препараты.

СОСТАВ в 1 л: Витамин А - 2 500 000 МЕ, витамин В1-3 500 мг, витамин В2 -2 000 мг, витамин В5-15 000 мг, витамин В6-2 000 мг, витамин В9-2 мг, витамин В12-10 000 мг, витамин D3-300 000 МЕ, витамин Е – 4 000 мг, витамин К3-250 мг, холин хлорид, лизин, метионин, карвакол, тимол, сесквитерпены, феноловые кислоты, флавоноиды, фитостерины, смолистые и минеральные соединения, изохинолиновые алкалоиды (хелидонин, хелеридин, сангвинарин, берберин), феноловые кислоты, сапонины, дубильные вещества. Содержание активных веществ 75%.

ПОКАЗАНИЯ: **ХЕРБИВИТ** рекомендуется применять всем видам домашней птицы с целью:

- безопасного и оптимального выращивания молодой птицы,
- ускорения выздоровления после перенесенных инфекционных болезней у взрослой птицы,
- профилактики дефицита в организме птицы ряда веществ, содержащихся в **ХЕРБИВИТ**.

ДОЗИРОВКА:

Длительность применения			Количество часов скармливания в сутки	Дозировка
Молодая птица	Профилактика	5 дней	12 часов	500 мл /1000 л питьевой воды
	Терапия	5 дней	12 часов	1000 мл / 1000 л питьевой воды
		5 дней	постоянно	500 мл /1000 л питьевой воды
Птица на откорме	Терапия	5 дней	12 часов	2000 мл / 1000 л питье- вой воды

КАРЕНЦИЯ: Не требуется

УПАКОВКА: 5 л, 10 л

C+

Источник витамина С



C+ это препарат жидкой формы витамина С, которая характеризуется более высоким усвоением. Витамин С улучшает кондицию животных.

СОСТАВ: витамин С (кислота л-аскорбиновая)

ПОКАЗАНИЯ: Препарат предназначен для подачи всем видам и производственным типам птиц:

- при нехватке витамина С
- в стрессовых ситуациях (вакцинации, заболевания, транспортировка, высокая влажность и температура или большие перепады температур).

ПРИМЕНЕНИЕ: 100мл/1000Л питьевой воды в течение 3-5 дней.

УПАКОВКА: 2Л

БИОТИН + ЦИНК

предотвращает воспалительное состояние кожи

БИОТИН + ЦИНК регулирует нарушение оперения (ломкость и выпадение перьев).
Улучшает плодовитость и продуктивность, повышает устойчивость к инфекциям.



СОСТАВ: D-биотин - 4.000.000 мкг /л; Цинк - 16.000 мг/л.

ПОКАЗАНИЯ:

- воспалительные состояния кожи пальцев,
- нарушения плодовитости и высиживания яиц,
- пероз,
- нарушения процесса оперения,
- отмирание зародышей,
- после болезней связанных с заразной инфекционной патологией.

ДОЗИРОВКА: Индейки: 200 мл/1000 л воды - особенно с 3 по 6 неделю жизни.

Остальная птица: 100-200 мл/1000 л воды, 6-8 ч в день, в течение 5-7 дней

КАРЕНЦИЯ: не требуется.

УПАКОВКА: 1 л

КАЛЬЦИМИКС

улучшает минерализацию костей и скорлупы яиц



КАЛЬЦИМИКС – это жидкий препарат, дополняющий диету животных легко усвояемыми микро- и макроэлементами. Содержащиеся в правильном соотношении кальций и фосфор, а также их совмещение с необходимыми в процессе окостенения минеральными соединениями способствует правильному росту костяка и укреплению скорлупы яиц.

СОСТАВ (мг/л):

Кальций 102.000 мг

Фосфор 50.600 мг

Магний 11.400 мг

Цинк 4.900 мг

Марганец 4.000 мг

ПОКАЗАНИЯ: Кальцимикс предназначен для использования всем видам домашней птицы:

- в период наиболее интенсивного роста птицы,
- в профилактике рахита, пероза, дисхондроплазиса,
- с целью улучшения яйценоскости и качества яиц,
- во время нарушения абсорбции питательных веществ.

ДОЗИРОВКА: 1 л/1000 л воды, выпаивать 16-20 ч в день, в течение 5 дней или по указаниям ветврача.

КАРЕНЦИЯ: Не требуется

УПАКОВКА: 5 л, 10 л

С комплекс

ограничивает отрицательные последствия стресса



С комплекс - это препарат, восстанавливающий гомеостаз организма. Он участвует в процессах окисления и восстановления, активирует метаболические ферменты, препятствует ломкости кровеносных сосудов, стимулирует иммунную систему и ограничивает риск развития вторичных осложнений. В стрессовых ситуациях, благодаря содержанию электролитов и глюкозы, он предотвращает обезвоживание и ослабление организма.

СОСТАВ (г/кг): Витамин С - 900 г, натрий - 28 г, Кальций - 14 г, Глюкоза - до 1000 г

ПОКАЗАНИЯ: “С комплекс” предназначен для применения всем видам домашней птицы:

- до и после прививки с целью повышения поствакцинальной устойчивости,
- при стрессах для предотвращения их негативного воздействия, путем нормализации гомеостаза организма,
- во время лечения антибиотиками для уменьшения осложнений от их применения,
- для укрепления кровеносных сосудов.

ДОЗИРОВКА: 75-200г/1000л питьевой воды, 6-8 часов в день в течение 3-5 дней или по указаниям ветврача.

КАРЕНЦИЯ: Не требуется

УПАКОВКА: 2 кг, 4 кг.



Комплекс АДЗЕК

витаминный препарат для домашней птицы



КОМПЛЕКС АДЗЕК - это препарат, дополняющий диету животных жирорастворимыми витаминами. Регулирует метаболизм кальция и фосфора, укрепляет естественные предохранительные барьеры организма, уменьшая восприимчивость к инфекциям. Благодаря антиоксидантным свойствам защищает печень, сердце и мышцы. Регулирует метаболизм ненасыщенных жирных кислот.

СОСТАВ: (в 1 л): Витамин А - 25.000.000 МЕ (retinol propionate 8.975 мг); Витамин D3 - 250.000 МЕ (холекальциферол 6.250 мкг); Витамин Е - 15.000 мг (октан D,L α - токоферола); Витамин К - 2500 мг.

РЕКОМЕНДАЦИИ: КОМПЛЕКС АДЗЕК рекомендуется всем видам домашней птицы:

- в случае недостатка жирорастворимых витаминов,
- во время наиболее интенсивного роста птиц,
- после лечения,
- после проведённых зоотехнических мероприятий.

ДОЗИРОВКА: 200-250 мл / 1000 л питьевой воды, в течение 3-5 дней 12 часов в день.

КАРЕНЦИЯ: не требуется

УПАКОВКА: 1Л 5Л

D₃ + Кальций

регулирует метаболизм кальция и фосфора



D₃ + Кальций является специфическим препаратом, жидкой консистенции, дополняющим диету животных витамином D₃. В соединении с кальцием, фосфором, магнием и цинком витамин D₃ улучшает метаболизм и использование минеральных веществ в организме, регулирует правильное развитие костяка и откладывание в нём минеральных солей. Улучшает яйценоскость и качество яиц.

СОСТАВ (1л): Витамин D₃ 12.5000.000 е.м.; Ca 10.000 мг; P 1000 мг; Mg 1000 мг;
Zn 1000 мг.

ПОКАЗАНИЯ: D₃ + Кальций применяется для всех видов домашней птицы:

- для профилактики рахита, пероза, дисхондроплазиса, остеопороза,
- при нарушении минерализации костяка и скорлупы яиц,
- в случае неправильно сбалансированной диеты (нарушение отношения Ca:P),
- в период наиболее интенсивного роста птицы, а также в пик яйценоскости.

ДОЗИРОВКА: 1 мл/10 птиц в день (препарат растворить в питьевой воде) в течение 3-5 дней или по указаниям ветврача.

КАРЕНЦИЯ: не требуется.

УПАКОВКА: 1 л, 5 л.

ДЗ+МИНЕРАЛ

Регулирует метаболизм кальция и фосфора



ДЗ+МИНЕРАЛ это препарат, дополняющий рацион животных витамином ДЗ, также кальцием, фосфором, магнием и цинком. Препарат поправляет метаболизм и усвоение минеральных веществ в организме, помогает правильному развитию костяка и откладываение в нем минеральных солей. Улучшает нескость и качество скорлупы яиц.

СОСТАВ (В 1л):

- глюконат кальция (11.1.3)($C_{12}H_{22}CaO_{14}xH_2O$)
- Хлорид магния (11.2.6)($MgCl_2$)
- Mg (хлорид магния) 750 мг
- Ca (глюконат кальция) 800 мг
- ортофосфорная кислота (E338)
- витамин Д3 (E671)(холикальциферол) 4 000 000 ед.
- Zn (E6)(хлорид цинка) 1400 мг
- зола сырая — 2%

ПОКАЗАНИЯ: **ДЗ+МИНЕРАЛ** предназначен для подачи всем видам и производственным типам птицы:

- профилактически в период наиболее интенсивного роста птиц, а также на пике нескости
- профилактически при рахите, перозе, дисхондроплазии, остеопорозе
- при нарушениях минерализации костей и скорлупы яиц
- в случае плохо сбалансированной диеты (нарушения пропорции Ca:P)

ДОЗИРОВКА: 500 мл/1000 л питьевой воды в течение 3-5 дней.

КАРЕНЦИЯ: Не требуется

УПАКОВКА: 5Л

Е-СЕЛЕН

предохраняет сердце и кровеносные сосуды



Е-СЕЛЕН - это препарат, сочетающий синергетические свойства витамина Е и селена. Он повышает естественную устойчивость организма к инфекциям и тепловому стрессу. Обуславливает функциональную способность мышечной и нервной тканей, кровеносных сосудов, а также соответствующий метаболизм ненасыщенных жирных кислот. Является активным стимулятором гормональной системы, влияет на процессы размножения.

СОСТАВ (мг/л): Витамин Е 102.000 мг; Селен 2000 мг;
носитель до 1000 мл.

ПОКАЗАНИЯ: Применяется для всех видов домашней птицы и свиней. **Е-СЕЛЕН** применяемый в профилактике повышает устойчивость организма и предотвращает дефицит витамина Е и селена.

ДОЗИРОВКА: 100мл/1000л питьевой воды, выпаивать 6-12 часов в день в течение 3-5 дней или по указаниям ветврача.

КАРЕНЦИЯ: Не требуется

УПАКОВКА: 1 л, 5л

МАНГАМАКС

Марганец, магний, лизин



МАНГАМАКС – это специализированный препарат, содержащий марганец и магний, поддерживающие гомеостаз двигательной системы. Магний, содержащийся в препарате, повышает активность мышц скелета, а марганец снижает судороги мышц, улучшая двигательные возможности птиц.

СОСТАВ:

Хлорид магния, сорбитол, марганец, лизин

ПОКАЗАНИЯ: МАНГАМАКС предназначен для подачи всем видам и производственным типам птиц:

- при нехватке веществ, содержащихся в препарате.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1000мл/1000Л питьевой воды

УПАКОВКА: 5Л

Макси В

комплекс витаминов группы В для домашней птицы



Макси В - это препарат, дополняющий рацион животных витаминами группы В с добавкой липотропных веществ. Способствует действию кроветворной системы и предотвращает анемию. Обуславливает правильное функционирование нервной системы и клеточного обмена веществ. Повышает эффективность ферментативных процессов и метаболический обмен белков, углеводов и жиров.

СОСТАВ (в 1 л):

Витамин В₁ 5 г
Витамин В₂ 3 г
Витамин В₅ 18 г
Витамин В₆ 9 г
Витамин В₁₂ 250 мг

ПОКАЗАНИЯ: **Макси В** предназначен для любого вида домашней и производственной птицы:

- в период наиболее интенсивного роста птиц;
- в случае снижения привесов;
- после заболеваний.

ДОЗИРОВКА: 100 мл/10 000 птиц в сутки

КАРЕНЦИЯ: Не требуется

УПАКОВКА: 1 л., 5 л.

ИНДОЦИД

*сильнодействующее подкисляющее средство,
предупреждает поносы и способствует пищеварению*



ИНДОЦИД - это сильнодействующий препарат, снижающий pH пищеварительного тракта. Повышает аппетит, снижает риск пищевых отравлений, ограничивает поносы и улучшает всасывание питательных веществ. Очищает воду, тормозит развитие патогенных бактерий и грибов, в частности, *E.Coli*, *Salmonella*, *Candida*.

СОСТАВ:

Ортофосфорная кислота	магний	4 г
Лимонная кислота	медь	10 г
Яблочная кислота	калий	20 г
Муравьиная кислота	натрий	10 г

Содержание активных элементов 75 %

ПОКАЗАНИЯ:

Показания	частота подачи	время подачи	доза на 1000л воды
Профилактика	2 - 3 раза в неделю	6-8 ч в день	1 л – 1,5 л
В период изменения корма	2 дня до и 2 дня после изменения	8–12 ч в день	1 л – 1,5 л
При поносе	до	постоян	1,5 л - 2

Показания	частота подачи	время подачи	доза на 1000л воды
	прекращения симптомов	но	л
После лечения антибиотиками	2 - 3 дня	постоянно	0,5 л – 1 л

КАРЕНЦИЯ: Не требуется

УПАКОВКА: 10 кг, 25 кг



Мульти АКТИВ

сильный кислотный концентрат для домашней птицы



Мульти АКТИВ - это препарат, снижающий pH пищеварительного тракта. Он уменьшает воспалительные состояния кишечника и препятствует развитию диареи. Очищает питьевую воду благодаря способности тормозить развитие болезнетворных бактерий и грибов, в частности, *E.Coli*, *Salmonella*, *Candida*.

СОСТАВ: Органические и неорганические кислоты:

ортофосфорная
лимонная
яблочная
пропионовая
муравьиная

ПОКАЗАНИЯ: **Мульти АКТИВ** применяется с профилактической целью, а также с терапевтической при заболеваниях пищеварительной системы и для стимулирования пищеварительной активности. Препарат можно применять всем видам и производственным группам домашней птицы.

ДОЗИРОВКА: 0,5-1,5 л/1000 л питьевой воды, 8-16 часов в сутки, в течение 2-3 дней.

КАРЕНЦИЯ: Не требуется.

УПАКОВКА: 10 кг, 25 кг

ИЗО АКТИВ

подкисляющий электролитический препарат



ИЗО АКТИВ - это уникальное сочетание смеси веществ, подкисляющих содержимое пищеварительного тракта, и активных электролитов. Использование препарата позволяет одновременно улучшить переваримость корма и пополнить количество электролитов. Поэтому **ИЗО АКТИВ** особенно пригоден в период теплового стресса и при длительных поносах.

СОСТАВ: Кислоты: ортофосфорная, лимонная, муравьиная; натрий 30 г/л; калий 15 г/л; стабилизатор.

Содержание активных веществ 70%.

ПОКАЗАНИЯ: **ИЗО АКТИВ** предназначен для любых видов домашней птицы:

- при отсутствии аппетита и нарушениях пищеварения;
- в случае появления поноса и в период высоких температур окружающей среды;
- после применения антибиотиков.

ДОЗИРОВКА: 1-1,5 л/1000 л питьевой воды, 8-16 часов в день, в течение 3-5 дней

КАРЕНЦИЯ: Не требуется.

УПАКОВКА: 5 л, 10 л, 25 кг.





www.pandavet.com